Bildiri No: **TPB-017** **Doi:** 10.5606/phhb.dergisi.suppl2026.017

Levodopa/Benserazid İlişkili Alerjik Cilt Reaksiyonu: Nadir Görülen Bir Yan Etki

Sadettin Kalenderoğlu, Gülsen Babacan-Yıldız

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Parkinson Hastalığı (PH), substantia nigra pars compacta'daki dopaminerjik nöronların progresif dejenerasyonu ile karakterize, motor ve non-motor semptomların bir arada seyrettiği nörodejeneratif bir hastalıktır. Parkinson hastalığının semptomatik tedavisinde "altın standart" olan Levodopa, biyoyararlanımı artırmak amacıyla benserazid gibi dopa-dekarboksilaz inhibitörleri ile kombine edilir. Bu kombinasyona bağlı kütanöz hipersensitivite reaksiyonları %1'den az görülmektedir. Bu vaka bildiriminde, dozla ilişkili seyreden nadir bir alerjik dermatit vakası ele alınmaktadır.

Olgu: Elli dört yaşında erkek hasta, sağ kolda titreme ve hareketlerde yavaşlama şikayetleri ile başvurdu. Muayenesinde sağda belirgin rijidite, istirahat tremoru ve Meyerson bulgusu (+) saptanarak hastaya "Tremor Dominant İdiyopatik PH" tanısı konuldu. Tedaviye levodopa/benserazid 100/25 mg 3x1 ve ropinirol 4 mg 2x1 başlandı. Levodopa/benserazid dozu 150/37,5 mg/gün düzeyine ulaştığında gövde ve baş-boyun bölgesinde eritematöz papül ve plaklar gelişti. Dozun 300/75 mg/gün'e çıkarılmasıyla lezyonlarda dramatik artış gözlendi. Laboratuvarda hafif eozinofili dışında bulgu saptanmadı. Mesleki kontakt dermatit ve seboreik dermatit dışlanarak tablo "Levodopa/Benserazid İlişkili Alerjik Dermatit" olarak değerlendirildi. İlacın kesilmesini takiben bir ay içinde lezyonlar tamamen geriledi. Hastanın semptomatik tedavisine apamorfin hidroklorür (SC) ile devam edildi.

Sonuç: Literatürde bu reaksiyonların levodopadan ziyade benserazide bağlı olabileceği belirtilmektedir. Olgumuzdaki net doz-yanıt ilişkisi, ilaca bağlı hipersensitivitenin karakteristik bir göstergesidir. Klinisyenlerin, özellikle doz artış dönemlerinde kütanöz yan etkiler konusunda dikkatli olması tedavi başarısı açısından kritiktir.