Bildiri No: **PB-023** **Doi:** 10.5606/phhb.dergisi.suppl2026.023

Alien Hand Sendromu ile Prezente Olan Multiple Skleroz Atağı

Aslı Sena Özer, Canan Emir

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Yabancı el sendromu (AHS), genellikle üst ekstremitede olmak üzere, bir uzvun istemsiz, ancak görünüşte amaçlı hareketleriyle karakterize nadir bir nörolojik durumdur; etkilenen bireyin farkındalığı ve kontrolü değişkendir. Ekstremitenin yabancılaşması hissi, yabancı kontrol ve hareketlerin istemsiz olarak yansıtılması veya kısıtlanması gibi bir dizi tuhaf duyumla ilişkilidir. Yabancı el sendromunun genellikle interhemisferik bağlantı kopukluğunun bir formu olduğu düşünülmektedir. Premotor alan, korpus kallosum, medial frontal lob, posterior parietal veya talamustaki çeşitli lezyonlardan kaynaklanır. Bu sendrom, Multipl Skleroz (MS) hastalarında nadiren bildirilmiştir. Yabancı el sendromu en sık inmelerde görülür, kortikobazal dejenerasyon, yer kaplayan lezyonlar diğer nedenlerdir. Psikiyatrik hastalıklar ayırıcı tanıda önemlidir.

Olgu Sunumu: Burada, sol eliyle istemli hareketleri başlatmakta ve sürdürmekte güçlük yaşayan, objeleri tutma ve kullanma sırasında belirgin apraksi bulguları gösteren daha önce Multıple Skleroz tanısı olan 25 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Kranial manyetik rezonans görüntülemesinde korpus kallosumda ve servikal spinal kordda kontrast tutan aktif demiyelinizan lezyonlar mevcuttu. Olgu MS atak olarak değerlendirildi ve üç gün 1 gr intravenöz ve klonozepam tedavisi uygulandı. Tekrarlayan semptomların kontrolü aralıklı steroid ve klonozepam tedavisi ile 6 ay içinde sağlanabilmiştir.

Sonuç: Bu olgu dolayısıyla AHS'nin nadir de olsa multıpl skleroz olgularında atak bulgusu olabileceğini ve tedavide etyolojiye uygun olarak MS atak tedavisi yanında botulinum toksin enjeksiyonları, klonazepam, görsel-uzamsal koçluk teknikleri, etkilenen elin dikkatini dağıtma ve bilişsel davranışçı terapi yer aldığına vurgu yapılması amaçlanmıştır.