Bildiri No: **PB-043** **Doi:** 10.5606/phhb.dergisi.suppl2026.043

Erişkin Başlangıçlı Geri Döndürülebilir Nadir Bir İmmünolojik Serebellar Ataksi Olgusu

Meriç Berk Alpuruk, Elvin Hasanlı, Figen Gökçay

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Ataksi tıbbi literatürde harekete katılan kasların koordinasyonunun bozulmasını ifade eder. İmmün aracılı serebellar ataksiler heterojen bir hastalık grubunu kapsamakta olup ataksinin nadir nedenlerindendirler. İncelememizde serebellar ataksinin nadir nedenlerine dikkat çekmek ve erken dönemde uygun tedavi ile serebellar rezervi korunmuş hastalarda nörolojik bulgularda regresyon gözlenebildiğini vurgulamak amacıyla subakut ataksi ile prezente paraneoplastik serebellar dejenerasyon olgusu tartışılmıştır.

Olgu Sunumu: Bilinen kronik hastalığı olmayan 68 yaşında erkek hasta bir buçuk aylık progresif denge bozukluğu esas şikayetiyle tarafımıza başvurdu. Bastonla mobilize olabilmekteydi. Nörolojik değerlendirmesinde konuşması anlaşılabilecek düzeyde dizartri, ataksi ve bilateral intansiyonel tremor saptandı. Ek muayene bulgusu yoktu. Manyetik rezonans (MR) incelemesinde serebral hemisferlerde hafif kronik iskemik değişik dışında patolojik bulgu görülmedi. Etyolojik incelemelerde hastanın serumunda paraneoplastik SOX1 antikor pozitifliği saptandı. Odak taramasında sağ akciğerde malignite kuşkulu lezyon ve lenfadenomegali odakları izlendi. Hasta paraneoplastik serebellar dejenerasyon tanısı aldı. Kitle örneklemesi bronşiyal kökenli büyük hücreli nöroendokrin karsinom lehine yorumlandı. Hastaya radyoterapi ve kemoterapi planlandı. Tedavisinin dördüncü ayında kontrol pozitron emisyon tomografisi (PET) tetkikinde kitle hipermetabolizmasında tama yakın regresyon izlendi. Bu dönemde yapılan nörolojik muayenesinde hastanın konuşması net, ataksisi tam regrese ve desteksiz yürüyebilmekteydi. İntansiyonel tremorunda regresyon mevcuttu. Nörolojik bulguları bir daha tekrarlamadı. Sekizinci ayında kitle nüks progresyonu ve yaygın metastaz izlenen hasta tanısının yirminci ayında eksitus oldu.

Sonuç: Paraneoplastik serebellar dejenerasyon olguları malignite semptomu olmadan nörolojik yakınmalarla kliniğe başvurabilmektedir. Malignitenin atlanmaması amacıyla progresif ataksi ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır. SOX1 antikor pozitifliği sıklıkla küçük hücreli akciğer kanserine eşlik etmekte olup küçük hücre dışı akciğer kanseri birlikteliğiyle alakalı literatürde vaka düzeyinde örnekler bulunmaktadır. Büyük hücreli nöroendokrin karsinom ile birlikteliğine dair veri bulunamamıştır.